

Ráj obojživelníků



POZNÁVÁME BORY



Přítok z lesa málokdy stačí, aby se rybník naplnil tak jako v březnu 2021.

Rybník Bezdrev vlastní Obec Bory. Z okolních rybníků je jediný, který není využíván k chovu a lovu ryb. Patří k nejmenším v okolí Borů. Nachází se na okraji polí a lesa a proto není zemědělským hospodařením příliš ovlivněn.

V mělkém rybníku se voda brzy ohřívá, což prospívá drobným živočichům. Množství této potravy vyhovuje především žábám a čolkům. Jsou to čolek obecný a velký, blatnice skvrnitá, kuňka obecná a rosnička zelená. Ze skokanů jsou to hnědý, krátkonohý, ostronosý a zelený. Když si uvědomíme, že kolem Borů se vyskytuje 12 druhů, na Vysočině 15 a v České republice 21 druhů; je počet 9 druhů žab a čolků v tak malém rybníčku jedinečný. Rozmnožují se zde především druhy, které nesou přítomnost ryb. Po zbytek roku využívají okolní pole a les. Z plazů využívají prostředí rybníka užovka obojková a ještěrka živorodá. Rybník je ukázkou citlivého hospodaření v přírodě. Ohleduplnému a pozornému návštěvníkovi poskytne velký zážitek.



Rosnička zelená, naše jediná stromová žába, která potřebuje stromy a keře rostoucí v blízkosti rybníka.



Blatnici skvrnitá vyhovuje typ půdy v okolních polích. Její pulci v rybníku nachází ideální podmínky k vývoji. Mohou si svůj vývojový cyklus prodloužit a v dospělé žábu se proměnit až příští rok. Dorůstají velikosti až 15 cm, což je mezi žábami výjimečné!



Pulec blatnice

Skokan hnědý

Skokan ostronosý



Největší chloubou rybníka je přítomnost skokana ostronosého tzv. „modré žaby“. Část populace sem putuje za rozmnožením zřejmě z přírodní památky Mrázkova louka. Své snůšky zde kladou počátkem dubna, často zároveň se skokany hnědými.



Kromě běžné fauny se v rybníku vyskytují vzácné druhy hmyzu a bezobratlých. Jen vodních brouků zde bylo v roce 2021 zjištěno 20 druhů. Na snímku potápník rýhovaný.



Skokan zelený



Skokan krátkonohý



Rozmnožování skokanů hnědých.

Skokani zelený (na snímku) a krátkonohý se vyskytují ve vodě rybníka téměř v průběhu celého roku. Vodní prostředí využívají z místních žab nejdéle.



Mělká přítoková část rybníka, která přechází v podmáčenou louku je ideálním útočištěm kuňky obecné, která na Vysočině již téměř vymizela.



Náš největší vodní brouk vodmil černý.



Také se zde rozmnožují dva ze tří (v Borech se vyskytující) druhů čolků - obecný a velký (na snímku). Samcům těchto druhů vyrůstá na dobu rozmnožování na hřbetě ocasu ozdobný trásnitý lem.